

FERTIMICRO



MEZCLA LIQUIDA DE MICRONUTRIENTES COMPLEJADOS CON ÁCIDO GLUCÓNICO.
APORTE DE MICRONUTRIENTES: BORO, COBRE, HIERRO, MANGANESO, MOLIBDENO, ZINC.

Boro (B) soluble en agua	0,4% p/p (0,55% p/v)
Cobre (Cu) complejoado con AG	0,41% p/p (0,56% p/v)
Hierro (Fe) complejoado con AG	5,25% p/p (7,24% p/v)
Manganeso (Mn) complejoado con AG	3,1% p/p (4,27% p/v)
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,1% p/p (0,138% p/v)
Zinc (Zn) complejoado con AG	0,8% p/p (1,1% p/v)
Densidad	1,38 g/cc
pH	2,5
Agente complejante	AG
Intervalo de estabilidad del quelato	pH 2-10

*Composición comercializada en España. Con el fin de cumplir las normas nacionales e internacionales, pueden existir variaciones en las versiones comercializadas en otros países. Contacte con nuestro servicio técnico para verificar su formulación.

DESCRIPCIÓN

FERTIMICRO permite una aportación rica y proporcionada de micronutrientes complejados por ácido glucónico para mejorar su asimilación y protegerlos de interacciones no deseadas con otros compuestos químicos. **FERTIMICRO** presenta mínimo riesgo de quemaduras y daños por fitotoxicidad.

FERTIMICRO aporta de Boro, Cobre, Hierro, Manganeso, Molibdeno y Zinc, micronutrientes esenciales en la nutrición de las plantas. La ausencia parcial o total de alguno de ellos provoca síntomas de deficiencia, ocasionando disminuciones de cosecha.

FERTIMICRO debe aplicarse antes de que aparezcan las carencias evitando deficiencias en el funcionamiento del sistema metabólico.

DOSIS

Cultivo	D. Foliar cc/L	D. Radic. L/ha	Modo y época de aplicación
Aromáticas	1-1,2	1-2	2 a 3 aplicaciones repartidas en el ciclo de cultivo.
Cereales	1,5-2	2-2,5	Realizar aplicaciones según necesidad.
Cítricos	1-1,5	1,5-2	Aplicar en la brotación de primavera y verano.
Forestales	1-1,5	1-1,5	Desde el inicio de brotación hasta el desarrollo de brotes.
Frutales	1-1,5	1-1,5	Desde el inicio de brotación hasta el desarrollo de brotes.
Hortícolas	1-1,5	2-2,5	Desde 10 d antes de floración hasta 30 d antes de recolección.
Industriales	1-1,5	2-2,5	Realizar aplicaciones según necesidad.
Ornamentales	1-1,2	1-2	Preferentemente vía suelo, durante el ciclo de cultivo.
Tropicales	1,5-2	2-4	Aplicar a la salida del invierno y del verano.

*Para OTROS CULTIVOS que no estén en la lista, consulte el Servicio Técnico de Arvensis.

AVISO LEGAL. La compañía no se responsabiliza de la inobservancia de las instrucciones de la etiqueta.



Carretera Castellón km 226,9 Polígono Prides
50720 La Cartuja, Zaragoza, SPAIN
www.arvensis.com Tlf: +34 976 169 181