

# FERTIMICRO Mg



## APORTE DE MAGNESIO Y MICRONUTRIENTES

Óxido de Magnesio (MgO) complejoado con AG	4% p/p (5,5% p/v)
Boro (B) soluble en agua	0,2% p/p (0,3% p/v)
Cobre (Cu) complejoado con AG	0,2% p/p (0,3% p/v)
Hierro (Fe) complejoado con AG	2,7% p/p (3,7% p/v)
Manganeso (Mn) complejoado con AG	1,6% p/p (2,2% p/v)
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,05% p/p (0,07% p/v)
Zinc (Zn) complejoado con AG	0,35% p/p (0,5% p/v)
Densidad	1,4 g/cc
pH	3,5
Intervalo de estabilidad del quelato	pH 2-9

\*Composición comercializada en España. Con el fin de cumplir las normas nacionales e internacionales, pueden existir variaciones en las versiones comercializadas en otros países. Contacte con nuestro servicio técnico para verificar su formulación.

## DESCRIPCIÓN

**FERTIMICRO-Mg** es un fertilizante soluble de magnesio y microelementos (B, Cu, Fe, Mn, Mo y Zn) complejados con ácido glucónico para asegurar una eficaz y rápida fertilización.

**FERTIMICRO-Mg** es fundamental para mantener una elevada actividad fotosintética: el Mg participa en la formación de ATP, la fijación de CO<sub>2</sub>, la síntesis de proteínas, la formación de clorofila, el transporte del floema, la partición y utilización de fotoasimilados y la foto-oxidación en las hojas.

**FERTIMICRO-Mg** es fundamental para maximizar el transporte de carbohidratos de órganos fuente a órganos sumidero y conseguir altos rendimientos.

Aplicar foliarmente **FERTIMICRO-Mg** en etapas tardías para minimizar la producción de sustancias foto-tóxicas. Aplicar de forma curativa ante la aparición de la típica clorosis internerval por falta de Mg en hojas viejas, más comunes bajo altas intensidades de luz y limitaciones hídricas. También se puede aplicar **FERTIMICRO-Mg** de forma preventiva especialmente en suelos desgastados, arenosos y sujetos a lavados.

Aplicar vía foliar o por fertirriego en suelos con pH ácidos para facilitar la liberación de ácidos orgánicos por las raíces que contrarresten los efectos tóxicos del aluminio.

## DOSIS

Cultivo	D. Foliar cc/ L	D. Radic. L/ha	Modo y época de aplicación
Cítricos	2-2,5	1-2	2-3 aplicaciones en primavera y verano
Hortícolas	2-3	2-2,5	2-4 aplicaciones cada 15 días desde dos semanas después del trasplante
Parral y vid	1,5-2	1-1,5	2-3 aplicaciones desde brotación a envero
Olivo	1,5-2	1-1,5	2-3 aplicaciones entre brotación y envero
Tropicales	2-3	2-4	En primavera y a la entrada del otoño
Ornamentales y viveros	1,5-2	1.2	2-3 aplicaciones a lo largo del ciclo
Frutales de hueso y pepita	1,5-2	1-1,5	2 a 3 aplicaciones en primavera y verano
Ornamentales	1-1,2	1-2	Preferentemente vía suelo, durante el ciclo de cultivo
Tropicales	1,5-2	2-4	Aplicar a la salida del invierno y del verano

\*Para OTROS CULTIVOS que no estén en la lista consulte el Servicio Técnico de Arvensis.

AVISO LEGAL. La compañía no se responsabiliza de la inobservancia de las instrucciones de la etiqueta.



Carretera Castellón km 226,9 Polígono Prides  
50720 La Cartuja, Zaragoza, SPAIN  
www.arvensis.com Tlf: +34 976 169 181