

FERTIMIX - Ca



CALCIO COMPLEJADO PARA APLICACIÓN FOLIAR

Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua	11,5 % p/p (16,1 % p/v)
Óxido de Calcio (CaO) complejado con AG	11,5 % p/p (16,1 % p/v)
Densidad	1,4 g/cc
pH	3,6
Agentes Complejantes	AG
Intervalo de estabilidad de la fracción complejada	pH 3,6-10,5

*Composición comercializada en España. Con el fin de cumplir las normas nacionales e internacionales, pueden existir variaciones en las versiones comercializadas en otros países. Contacte con el servicio técnico para verificar su formulación.

DESCRIPCIÓN

FERTIMIX - Ca es una formulación líquida con una alta concentración de calcio complejado con ácido glucónico. **FERTIMIX - Ca** consigue una fertilización eficiente ya que permite una rápida absorción del calcio y su translocación al fruto.

FERTIMIX - Ca activa y regula la división y el alargamiento celular. Influye en la compartimentación de la célula relacionada con la especialización de los órganos celulares. **FERTIMIX - Ca** resulta imprescindible para el desarrollo de órganos de crecimiento como raíces, brotes, frutos, etc. Carencias de Ca se manifiestan en deficiencias en la formación de la pared celular de los tejidos nuevos (puntas de las raíces, brotes y en la base de los frutos).

Aplicar **FERTIMIX - Ca** coincidiendo con las mayores necesidades de calcio, desde el comienzo de caída de pétalos hasta que el fruto alcanza 1/3 de su tamaño y durante el crecimiento rápido de brotes y frutos. Realizar varias aplicaciones sucesivas con intervalos de 1-2 semanas durante la fructificación y etapas de crecimiento rápido.

FERTIMIX - Ca se debe aplicar sistemáticamente en cultivos sensibles a fisiopatías relacionadas con el calcio: bitter-pit o acorchado en manzana, peseta en tomate y pimiento, blossom-end-rot en pepino, tip-burn en pimiento, necrosis foliar en lechuga y coles, corazón negro del apio, mancha púrpura del níspero, bifurcación de la raíz en remolacha, agrietamiento, corazón hueco de la fresa y tip-burn en fresón, etc. Son grandes consumidores de calcio: alfalfa, algodón, atramuz, apio, berenjena, cerezo, coles, colza, girasol, lechuga, lino, manzano, melón, olivo, patata, pepino, peral, pimiento, piña, tabaco, tomate y vid.

DOSIS

Cultivo	Dosis foliar cc/L	Dosis radicular L/ha	Modo de aplicación
Frutales de pepita	3-4	4-6	Realizar de 4 a 6 aplicaciones
Frutales de hueso	3-4	4-6	Realizar de 4 a 6 aplicaciones
Cítricos	3-4	6-8	Realizar de 4 a 6 aplicaciones
Tomate, pimiento	1,5-3	6-7	Aplicar cada 15 días en función de las necesidades del cultivo
Hortalizas (lechuga, apio...)	1,5-3	4-6	Realizar dos aplicaciones
Fresa y frambuesa	2-3	4-7	Realizar de 2-4 aplicaciones
Plataneras	2-3	6-8	Realizar de 4-6 aplicaciones

*Para OTROS CULTIVOS que no estén en la lista consulte el Servicio Técnico de Arvensis.

AVISO LEGAL. La compañía no se responsabiliza de la inobservancia de las instrucciones de la etiqueta.



Carretera Castellón km 226,9 Polígono Prides
50720 La Cartuja, Zaragoza, SPAIN
www.arvensis.com Tlf: +34 976 169 181