

GELYFLOW - CaB



SUSPENSIÓN CONCENTRADA DE CALCIO Y BORO

Calcio (Ca) total	14,9% p/p (21,6% p/v)
Boro (B) total	3,8% p/p (5,51% p/v)
Densidad	1,45 g/cc
pH	8-9

*Composición comercializada en España. Con el fin de cumplir las normas nacionales e internacionales, pueden existir variaciones en las versiones comercializadas en otros países. Contacte con el servicio técnico para verificar su formulación.

DESCRIPCIÓN

GELYFLOW-CaB es una suspensión concentrada de calcio (Ca) y Boro (B) que permite aportar una gran cantidad de estos nutrientes con volúmenes muy reducidos, ahorrando en el transporte y manejo de envases. Es especialmente recomendado cuando se empleen volúmenes de caldo reducidos. **GELYFLOW-CaB** puede ser aplicado vía foliar y al suelo.

GELYFLOW-CaB aporta conjuntamente calcio (Ca) y boro (B) dada la relación y sinergia entre estos nutrientes fundamentales para el desarrollo de las yemas apicales y de los ápices de las raíces. Sin estos nutrientes se paraliza el crecimiento de nuevas brotaciones y el de nuevas raíces. Ambos tienen funciones muy definidas y comunes: la síntesis de la pared celular y la integridad de la membrana plasmática.

GELYFLOW-CaB es muy aconsejable en zonas con elevadas temperaturas, baja o muy alta humedad relativa y elevada intensidad lumínica para evitar bitter-pit o acorchado, necrosis apical y foliar y el rajado del fruto. **GELYFLOW-CaB** también es aconsejable en zonas donde bajas temperaturas y luz escasa pueden interferir en los procesos de polinización que resulten en frutos deformes y/o huecos.

GELYFLOW-CaB posee una serie de adyuvantes que le confieren unas propiedades de mojabilidad excelentes en su uso. La elevada concentración de Ca y B aportada con **GELYFLOW-CaB** contribuye a una elevada absorción foliar por efecto de difusión pasiva.

DOSIS

Cultivo	Dosis foliar (cc/L)	Dosis suelo (L/ha y aplicación)	Modo de aplicación
Cítricos, frutales	1-1,5	2-4	1-2 Aplicaciones en flujos de crecimiento de primavera y otoño.
Hortícolas	2-3	2-4	Aplicar 1 semana después del 100% emergencia y repetir cada 10-15 días hasta 2-3 aplicaciones.
Parra y vid	6-9	2-4	Aplicar cuando las yemas sean visibles; repetir en hinchado de yemas y en fructificación.
Tropicales	1-2	2-4	Realizar 1-2 aplicaciones en fase de Pre-fructificación
Industriales	1,5-2,5	2-4	Aplicar a los primeros síntomas de carencia de Mn.
Cereales, café	3-6	2-4	Aplicar cuando el cultivo tenga de 8 a 10 hojas visibles hasta primer nudo.
Olivo	5-8	2-4	Aplicar en brotación.

*Para OTROS CULTIVOS que no estén en la lista consulte el Servicio Técnico de Arvensis.

AVISO LEGAL. La compañía no se responsabiliza de la inobservancia de las instrucciones de la etiqueta



Carretera Castellón km 226,9 Polígono Prdes
50720 La Cartuja, Zaragoza, SPAIN
www.arvensis.com Tlf: +34 976 169 181